

Ensayo clínico Prop-TBI

Información general del ensayo

Fármaco del estudio: MEDICAMENTO DE ENSAYO – BOTE BLANCO TAPA ROJA (propranolol o placebo en cápsulas)

Vía de administración: oral o SNG

Duración de tratamiento: 14 días (o hasta alta / fallecimiento)


Objetivo terapéutico: mantener la FC entre 60-100 lpm y PAS entre 110-160 mmHg



Pauta de dosificación

Dosis inicial: 10 mg cada 6 horas

Dosis máxima: 40 mg cada 4 horas (según respuesta hemodinámica)



Seguridad

Siempre registrar: la FC, PAS y PPC antes de cada dosis en la gráfica de ICCA

No administrar medicación si:

- $FC \leq 59$ lpm
- $PAS \leq 109$ mmHg
- $PPC \leq 59$ mmHg (si monitorizada)
- El paciente requiere noradrenalina $> 0,1$ mcg/kg/min

Avisar al médico responsable si NO se administra

Administración por SNG

Lavar la SNG con 15-30 ml de agua

Abrir la cápsula y diluir su contenido en 10-15 ml de agua

Administrar lentamente el contenido de la jeringa con la medicación

Lavar la SNG con 15-30 ml de agua

**Compatible con
Nutrición Enteral**